

## Le vaccin Pfizer Covid-19 multiplie par 15 la mortalité chez les patients COVID-19 pleinement vaccinés, supposément en affaiblissant le système immunitaire

Hervé Seligmann et Haim Yativ

15. Mar. 2021

1<sup>st</sup> draft

Une journaliste allemande, Alice Echtermann, a publié des données obtenues selon elle du ministère israélien de la Santé, cumulées du 20 décembre au 10 mars, sur les patients vaccinés et non vaccinés contre le COVID-19, <https://correctiv.org/faktencheck/2021/03/11/covid-19-in-israel-nein-die-impfung-erzeugt-keine-40-mal-hoehere-sterblichkeit/>. Son interprétation de ces données, en réaction à une publication de nakim.org, est que la vaccination a diminué les décès, de 1566 (non vaccinés) à 709 (entre les doses), à 84 (dans les 7 jours après la 2e dose) et à 105 (7 jours après 2e dose) (Tableau 1). Ceci est trompeur car les statuts de vaccination diffèrent par la durée et la taille des échantillons. Ajusté en fonction du temps, il y a 20 (= 1566 morts/80 jours), 34, 12 et 4 décès/jour pour les différents statuts vaccinaux, dans le même ordre que ci-dessus. Ajustés pour le nombre total de patients atteints de COVID-19, les décès/jour par personne augmentent de non-vaccinés à totalement vaccinés (tableau 1) et sont multipliés par 11,65, 27,92 et 15 (390-7,49) par rapport aux non vaccinés (tableau 1). Cela confirme une multiplication par trois des taux de détection du COVID-19 au cours des 7 premiers jours après la première dose, par rapport aux taux initiaux de COVID-19 le jour de la première injection (<http://www.nakim.org/israel-forums/download.php?id=727>).

Nous constatons également que les pourcentages de cas asymptomatiques (communauté) diminuent des non vaccinés à complètement vaccinés. La vaccination affaiblit probablement les réactions immunitaires naturelles, augmente les risques précisément pour ceux que la vaccination doit protéger. Nous soulignons que 1. cela n'inclut pas les effets indésirables non COVID-19 résultant notamment d'un affaiblissement du système immunitaire induit par la vaccination, 2. nos analyses simples sont aussi vraies que les données rapportées du ministère israélien de la Santé, et 3. les résultats ne contredisent pas la possibilité qu'une vaccination complète diminue les incidences du COVID-19. Le point 3 nécessite des informations non incluses dans le tableau d'origine, à savoir le nombre d'individus sans COVID-19 pour chaque statut vaccinal. Notamment, contrairement à d'autres pays, le ministère israélien de la Santé ne recommande pas les soins ambulatoires avec des médicaments potentiellement utiles comme le zinc, l'ivermectine ou les vitamines C et D. La vaccination massive doit être reconsidérée et tous les effets indésirables non COVID-19 examinés en relation avec le statut de vaccination.

COVID-19 statut \ Vacc. statut	Non vacc.	1 <sup>ere</sup> dose	2 <sup>eme</sup> dose < 7 jours	2 <sup>eme</sup> dose > 7 jours
Communauté (asymptomatique)	358454	51571	7675	4622
Léger	32547	587	100	106
Medium	1454	466	54	59
Sérieux	3381	1083	165	149
Critique	714	172	17	37
Décédé	1566	709	84	105
Total	368826	54588	8095	5078
Jours	80	21	7	~26 (1-52)
Morts par jour	19.575	33.76	12	4.04 (105-2.02)
Morts par day/total	0.0000531	0.000618	0.001482	0.000795 (0.021-3.98x10 <sup>-4</sup> )
Hausse mortalité vs non vacc.		11.65	27.92	14.99 (390-7.49)
Pourcent asymptomatiques	97.19	94.47	94.81	91.02
Pourcent/jour, symptomatiques	0.0352	0.2632	0.7412	0.3454 (8.98-0.17)
Hausse symptomatiques/non-vacc.		7.49	21.09	9.83 (255.46-4.91)

Tableau 1. Tableau obtenu de <https://correctiv.org/faktencheck/2021/03/11/covid-19-in-israel-nein-die-impfung-erzeugt-keine-40-mal-hoehere-sterblichkeit/>. Les data du ministère israélien de la Santé montrent que les cas de COVID-19 pour la période du 20 Décembre au 10 Mars. (Screenshot: CORRECTIV.Faktencheck). Traduit de l'hébreu au français. Nos additions sont soulignées.