

Die vollständige Pfizer Covid-19-Impfung erhöht die Mortalität bei COVID-19-Patienten um 15, was vermutlich auf eine Schwächung des Immunsystems zurückzuführen

Hervé Seligmann und Haim Yativ

15. Mar. 2021 1st draft

Eine deutsche Journalistin, Alice Echtermann, veröffentlichte Daten laut ihr vom israelischen Gesundheitsministerium, kumuliert vom 20. Dezember bis 10. März, über geimpften und nicht geimpften COVID-19-Patienten (<https://correctiv.org/faktencheck/2021/03/11/covid-19-in-israel-nein-die-impfung-erzeugt-keine-40-mal-hoehere-sterblichkeit/>). Ihre Interpretation dieser Daten, die auf eine Veröffentlichung von nakim.org reagierte, ist dass die Impfung die Todesfälle von 1566 (nicht geimpft) auf 709 (zwischen den Dosen), auf 84 (innerhalb von 7 Tagen nach der 2. Dosis) und auf 105 (7 Tage nach 2. Dosis) verringerte (Tabelle 1). Dies ist irreführend, da die verschiedenen Impfstatus sich in Dauer und Probengröße unterscheiden. Standardisiert für Dauer gibt es 20 (= 1566 Tote/80 Tage), 34, 12 und 4 Todesfälle / Tag für die verschiedenen Impfstatus (Reihenfolge wie oben). Standardisiert für die Gesamtzahl der COVID-19-Patienten steigt der Tod pro Tag pro Person von nicht geimpft zu vollständig geimpft (Tabelle 1) und ist um 11,65, 27,92 und 15 (390-7,49) mal höher als bei nicht geimpften (Tabelle 1). Dies bestätigt einen dreifachen Anstieg der COVID-19-Raten während der ersten 7 Tage nach der 1. Dosis im Vergleich zu den anfänglichen COVID-19-Raten am Tag der 1. Dosisinjektion (<http://www.nakim.org/israel-forums/download.php?id=727>).

Wir sehen auch, dass der Prozentsatz der asymptomatischen Fälle (Gemeinschaft) von nicht geimpft zu vollständig geimpft abnimmt. Die Impfung schwächt wahrscheinlich die natürlichen Immunreaktionen, erhöht das Risiko gerade für diejenigen, die durch Impfungen geschützt werden sollen. Wir betonen, dass 1. dies keine Nicht-COVID-19-Nebenwirkungen einschließt, die aus einer durch Impfung verursachten Schwächung des Immunsystems resultieren, 2. unsere einfachen Analysen genauso korrekt sind wie die Daten das Gesundheitsministerium veröffentlichte, und 3. die Ergebnisse nicht der Möglichkeit widersprechen dass die vollständige Impfung die COVID-19-Inzidenz verringert. Punkt 3 erfordert Daten die in der Originaltabelle nicht aufgeführt sind, nämlich die Anzahl der Personen ohne COVID-19 für jeden Impfstatus. Insbesondere, im Gegensatz zu anderen Ländern, empfiehlt das israelische Gesundheitsministerium keine ambulante Versorgung mit potenziell hilfreichen Arzneimitteln wie Zink, Ivermectin oder Vitamin C und D. Eine massive Impfung sollte überdacht und alle Nicht-COVID-19-Nebenwirkungen in Bezug auf den Impfstatus untersucht werden. Massive Impfung sollte überdacht werden und alle Nicht-COVID-19-Nebenwirkungen in Bezug auf den Impfstatus untersucht werden.

COVID-19 status\Impfstatus	Ungeimpft	1 st Dose	2 nd Dose < 7 Tag	2 nd Dose > 7 Tag
Gemeinschaft (asymptomatisch)	358454	51571	7675	4622
Leicht	32547	587	100	106
Medium	1454	466	54	59
Ernst	3381	1083	165	149
Kritisch	714	172	17	37
Verstorben	1566	709	84	105
Total	368826	54588	8095	5078
Tage	80	21	7	~26 (1-52)
Verstorbene pro Tag	19.575	33.76	12	4.04 (105-2.02)
Verstorbene pro Tag /Total	0.0000531	0.000618	0.001482	0.000795 (0.021-3.98x10 ⁻⁴)
Sterblichkeitserhöhung/ungeimpft		11.65	27.92	14.99 (390-7.49)
Prozent asymptomatisch	97.19	94.47	94.81	91.02
Prozent symptomatisch /Tag	0.0352	0.2632	0.7412	0.3454 (8.98-0.17)
Sterblichkeitserhöhung/ungeimpft		7.49	21.09	9.83 (255.46-4.91)

Tabelle 1. Tabelle von <https://correctiv.org/faktencheck/2021/03/11/covid-19-in-israel-nein-die-impfung-erzeugt-keine-40-mal-hoehere-sterblichkeit/>. Daten vom israelischen Gesundheitsministerium mit COVID-19 Fällen für die Dauer vom 20. Dezember 20 zum 10. März (Screenshot: CORRECTIV.Faktencheck). Übersetzt von Hebräisch zu Deutsch. Unsere Ergänzungen sind hervorgehoben.